

Jordprøvetagning – vejledning

Én blandingsprøve repræsenterer en hel mark. Disse seks punkter afgør, om rapporten passer.



Soil Balancing · Haney · Totalaufschluss

1 Tidspunkt

Muligt hele året. Bedst: forår før første gødsning eller sommer/efterår efter høst. Mindst 3 uger efter sidste gødsning, jorden fugtig men bearbejdelig. For Haney desuden 2–3 uger efter jordbearbejdning – og husk, at den mikrobielle aktivitet naturligt er lavere i tørkeperioder og vinterkulde.

2 Udstyr

Jordbor i rustfrit stål eller spade, ren spand, 2–3 l pose med lynlås, vandfast tusch. Intet galvaniseret værktøj (zink!) og ingen handsker, der har rørt gødning.

3 15–20 stik

Jævnt over marken i zigzag. Hold afstand til markkanter, forager, oplagspladser og veje. Del marker over 5 ha eller med synligt forskellig jord.

4 Dybde

Agerjord ca. 0–20 cm. Græsland og lavbundede jorde 0–10 cm. Altid samme dybde for alle stik – og noter den på følgesedlen.

5 Bland & fyld

Bland alle borekerner godt i spanden, fjern sten og planterester. Ca. 600 g pr. prøve, ca. 1 kg for kombinationen Soil Balancing + Haney.

6 Mærk & send

Pose med nummer, navn og marknavn – nøjagtigt som på følgesedlen. For Haney: prik et par nålehuller i toppen af den lukkede pose, så mikroberne kan trække vejret. Send straks, lad ikke posen ligge i solen. Vedlæg den underskrevne følgeseddel.

Tjekliste før forsendelse

- | | |
|--|---|
| ☐ Følgeseddel udfyldt helt og underskrevet | ☐ Haney: nålehuller i posen |
| ☐ Prøvepose mærket nøjagtigt som på følgesedlen | ☐ Pakke til det rigtige laboratorium: Soil Balancing → AGROLAB Sarstedt · kun Haney → IAU Freyburg |
| ☐ Samme dybde for alle stik, dybde noteret | ☐ Kopi af følgesedlen gemt til dig selv |
| ☐ Ca. 600 g (1 kg ved SB + Haney) pr. prøve | |

Sendes til: AGROLAB Agrar GmbH, Breslauer Straße 60, 31157 Sarstedt, Tyskland (Soil Balancing, også med Haney) · Institut für Agrar- und Umweltanalytik, Querfurter Straße 9, 06632 Freyburg/Unstrut, Tyskland (kun Haney, totalopløsning)