


Soil Balancing + bodemvitaliteit volgens Haney · totaalevaluatie

BODEMCHEMIE



pH (H₂O) **5,18** | Haney-waarde

pH (CaCl₂) **4,63** | Streef 6,0-6,5


Grondsoort zwak lemig zand C/N 17,4 bulkdichtheid 1,39 g/cm³ · berekend

ENR (N-nalevering) ≈ 67 kg N/ha · geschat


BASENVERZADIGING AAN DE DRIE ADSORPTIECOMPLEXEN

rode markering = streefwaarde


CEC pot (DIN)




CEC act



CEC plantbeschikbaar *



BODEMBIOLOGIE



Organische stof **6,48 %** | Haney-waarde

microb. ademhaling (CO₂) **27,0 mg/kg**

Microbenvoer-C **199 mg/kg**

Microbenvoer-N **124 kg/ha**

microbieel actief C **13,6 %**

microbieel actief C: boven 80 % = humusafbrekend milieu · onder 30 % = te geringe activiteit ondanks voedselaanbod

PLANTBESCHIKBARE STIKSTOF EN FOSFOR IN HET GROEISEIZOEN

plantbeschikbare stikstof (N) **68** kg N/ha plantbeschikbaar fosfaat (P₂O₅) **149** kg P₂O₅/ha

Plantbeschikbare N en P in het groeiseizoen op basis van de biologische en chemische parameters en de aanname van meerdere neerslagperiodes tijdens het groeiseizoen.

De drie belangrijkste maatregelen

Probleem	Maatregelen	Opmerking
te lage pH en calcium-/magnesiumverzadiging	bemesten in de vorm van kalk en sulfaat	zie bemestingsadvies
te weinig actief C	jaarrond groenbedekking, toepassing van biostimulanten, bekalking, toepassing van plantenkool (biochar), bodem beluchten ...	
te geringe microbiële ademhaling	jaarrond groenbedekking, toepassing van biostimulanten, organische bemesting ...	

GROENBEMESTER-ADVIES

Grassen 83 % Vlinderbloemigen / Brassica 17 % Microbenvoer C : N zeer nauw — accent op koolstofaanvoer



Methoden & opmerkingen

* CEC plantbeschikbaar = som van Ca, Mg, K, Na en H⁺ uit de H3A-extractie (Haney); alleen het direct beschikbare deel van het adsorptiecomplex, daardoor duidelijk lager dan CEC pot (DIN ISO 13536) en CEC act. Potentiële verzuring: afgeleid uit (Ca + Mg) : Al van de H3A-extractie. Nutriëntenbalans: gewogen afwijking van het optimum (pH, CEC-verschil, basenverzadiging, nutriënten-streefwaarden), vóór bemesting. pH-waarden en organische stof uit de Haney-analyse; basenverzadigings-streefwaarde (CEC-pot-afhankelijk) aan alle drie de adsorptiecomplexen.

Nutriëntengehalten · verhoudingen · wisselwerkingen

NUTRIËNTENGEHALTEN – TWEE FRACTIES

per nutriënt: plantbeschikbaar (Haney H3A) en naleverbaar/uitwisselbaar (Mehlich-3), kg/ha


	plantbeschikbaar (H3A)			naleverbaar (Mehlich-3)		
	IS	STREEF		IS	STREEF	
Calcium	559	831		2.291	8.219	
Magnesium	113	88,0		209	625	
Kalium	377	95,3		436	564	
Natrium	49,2	–		41,7	59,1	
Fosfor (PO ₄ / M3)	191	58,2		523	179	
nalev. org. fosfor	69,0	29,1		–		
Zwavel	84,4	88,2		75,1	139	
Borium	0,441	3,65		0,445	3,96	
Koper	0,412	0,300		1,39	18,1	
Mangaan	5,09	14,7		33,4	209	
Ijzer	1.504	88,2		2.349	723	
Zink	15,3	13,0		30,3	27,8	
Molybdeen	0,056	0,500		n. m.	1,58	
Kobalt	0,032	4,00		1,67	8,09	
Seleen	–			0,862	3,61	

‡ Kobalt/seleen uit totaalontsluiting. IS en STREEF in kg/ha; markering = positie IS t.o.v. STREEF (midden = STREEF bereikt).


NUTRIËNTENVERHOUDINGEN

in overmaat in balans in overmaat


Mehlich-3 / CAL (Soil Balancing)



H3A / bodembioïlogie (Haney)



NUTRIËNTEN-WISSELWERKINGEN (MULDER)



Weergegeven worden alleen de in dit monster aanwezige negatieve wisselwerkingen en de synergieën die voor het herstel van het evenwicht kunnen worden benut.

LUFA-STANDAARDANALYSE · GEHALTEKLASSEN

Nederland · gehalteklassen volgens Beiers schema

Fosfor (P ₂ O ₅ , CAL)	38,7 mg/100 g	Kl. E
Kalium (K ₂ O, CAL)	16,8 mg/100 g	Kl. D
Magnesium (CaCl ₂)	7,4 mg/100 g	Kl. C

Bemestingsadvies

Meststof	Hoeveelheid	Dekt	Periode	Toediening / opmerking
Dolomiet 60 % CaCO ₃ · 25 % MgCO ₃	4.000 kg/ha	Calcium + magnesium (opbouw basenverzadiging)	verdeeld over 3–4 jaar	Basisbemesting (Ca + Mg); onderhoudsbekalking na carbonaattest voortzetten. Niet met sporenelementen mengen – in de tijd scheiden.
Natriummolybdaat 39 % Mo	5,5 kg/ha	Molybdeen	verdeeld over 3–4 jaar	Vóór de sulfaatmeststoffen toedienen (Mo-beschikbaarheid daalt bij sulfaat-S). Bladbemesting; mengbaar onder drijfmest.
Calciumsulfaat (gips) 33 % CaO · 46 % SO ₃	550 kg/ha	Sulfaatzwavel + calcium	verdeeld over 3–4 jaar	Leverd Ca en sulfaatzwavel zonder pH-verhoging; in het voorjaar strooien. Niet met wateroplosbare P combineren (vastlegging).
Kieseriet 25 % MgO · 50 % SO ₃	300 kg/ha	Magnesium (+ sulfaatzwavel)	verdeeld over 3–4 jaar	Goed wateroplosbaar; in het voorjaar in het groeiende gewas of in de groenbemester strooien, over meerdere giften over de jaren verdelen. Dekt tegelijk het sulfaataandeel van de zwavel.
Magnesia-Kaïniët 9 % K ₂ O · 4 % MgO · 36 % Na ₂ O · 8 % SO ₃	80 kg/ha	Kalium + magnesium + natrium (+ sulfaat-S)	1–2 jaar	Dekt K, Mg en Na gezamenlijk; strooien. Let op chloride– niet kort vóór chloridegevoelige gewassen.
Kaliumsulfaat 50 % K ₂ O · 45 % SO ₃	180 kg/ha	Kalium	2–3 jaar	Geringe K-behoefte – in één gift te dekken. In het voorjaar in het groeiende gewas strooien.
Boorzuur 17,4 % B	30 kg/ha	Borium	verdeeld over 3–4 jaar	Niet op voorraad te bemesten; bladbemesting, jaarlijks naar behoefte herhalen.
Kopersulfaat 23 % Cu	29 kg/ha	Koper	verdeeld over 3–4 jaar	Niet samen met kalk/calcium – in de tijd scheiden; met humuszuren werkzamer.
Mangaansulfaat 30 % Mn	50 kg/ha	Mangaan	verdeeld over 3–4 jaar	Bladbemesting, niet met kalk/calcium mengen, met humuszuren werkzamer.
Natriumselenaat 39 % Se	2 kg/ha	Seleen	verdeeld over 3–4 jaar	Voor voeder- en diergezondheid; als bladgift toedienen.


AANWIJZINGEN VOOR DE UITVOERING

Toediening – groenbemester, klaver-/luzernegras of opnamesterke hoofdteelt: De aanbevolen meststofhoeveelheden zijn soms zeer hoog. De toediening veroorzaakt een kortstondige onbalans waarop het bodemleven zich eerst moet instellen. Bij voorkeur in groenbemester- of klaver-/luzernegrasbestanden toedienen – daar worden de nutriënten gedynamiseerd en liggen ze voor het volggewas in de juiste verhouding klaar. Als alternatief kunnen de meststoffen ook direct in hoofdteelten met een goed opnamevermogen voor het betreffende nutriënt worden toegediend – daar tot maximaal het dubbele van de gewasbehoefte per gift. Opnamesterke gewassen: Sulfaten (S): Koolzaad, kool- en uien gewassen, peulvruchten, grasland Calcium: Koolzaad, aardappelen, koolgewassen, klaver-/luzernegras, grasland Magnesium: Aardappelen, bieten, maïs, klaver-/luzernegras Kalium: Bieten, aardappelen, maïs, koolgewassen, klaver-/luzernegras Natrium: Suiker-/voederbieten (natriumminnend), voederkool Fosfor: Aardappelen, maïs, klaver-/luzernegras, grasland Borium: Koolzaad, suiker-/voederbieten, zonnebloemen, koolgewassen, luzerne	Molybdeen: Peulvruchten, klaver-/luzernegras, koolsoorten, koolzaad Kobalt: Peulvruchten (veldboon, soja, lupine, erwt), klaver-/luzernegras Koper: Haver, tarwe, gerst, zonnebloemen, grasland Zink: Maïs, vlas, hop, fruitteelt Mangaan: Haver, tarwe, suiker-/voederbieten, erwten/veldbonen Seleen: Grasland (voederkwaliteit)
Organische bemesting: Aan organische meststoffen dienen dragerstoffen (steenmeel / plantenkool) te worden toegevoegd om uitspoeling te voorkomen en het adsorptiecomplex niet met nutriënten te overladen.	
Sporenelementen: Zink (evenals koper, mangaan, ijzer, kobalt) niet samen met kalk/calcium toedienen – in de tijd scheiden. Ze kunnen voor de toediening ook gezamenlijk onder drijfmest/compost worden gemengd (in plaats van bladbemesting).	
Systemische aanpak: De methode heeft alleen in samenspel met consequente groenbemesterteelt, onderzaai en mengteelt het gewenste resultaat.	

De berekende meststofhoeveelheden zijn richtwaarden voor het sluiten van het vastgestelde nutriëntentekort; het naleven van de geldende bemestingsregelgeving (bijv. mestwetgeving, uitrijdverboden, bedrijfsspecifieke plafonds) valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. De weergegeven waarden en adviezen vervangen geen individueel deskundig advies en zijn niet juridisch bindend.

Soil Balancing + bodemvitaliteit volgens Haney · totaalevaluatie

BODEMCHEMIE



pH (H₂O) **5,07**

pH (CaCl₂) **4,60**


Grondsoort zwak leemig zand C/N 16,8 bulkdichtheid 1,39 g/cm³ · berekend

ENR (N-nalevering) ≈ 74 kg N/ha · geschat


BASENVERZADIGING AAN DE DRIE ADSORPTIECOMPLEXEN

rode markering = streefwaarde


CEC pot (DIN)




CEC act



CEC plantbeschikbaar *



BODEMBIOLOGIE



Organische stof **6,54 %**

microb. ademhaling (CO₂) **24,0 mg/kg**

Microbenvoer-C **166 mg/kg**

Microbenvoer-N **91,2 kg/ha**

microbieel actief C **14,4 %**

microbieel actief C: boven 80 % = humusafbrekend milieu · onder 30 % = te geringe activiteit ondanks voedselaanbod

PLANTBESCHIKBARE STIKSTOF EN FOSFOR IN HET GROEISEIZOEN

plantbeschikbare stikstof (N) **62** kg N/ha plantbeschikbaar fosfaat (P₂O₅) **157** kg P₂O₅/ha

Plantbeschikbare N en P in het groeiseizoen op basis van de biologische en chemische parameters en de aanname van meerdere neerslagperiodes tijdens het groeiseizoen.

De drie belangrijkste maatregelen

Probleem	Maatregelen	Opmerking
te lage pH en calcium-/magnesiumverzadiging	bemesten in de vorm van kalk en sulfaat	zie bemestingsadvies
te geringe microbiële ademhaling	jaarrond groenbedekking, toepassing van biostimulanten, organische bemesting ...	
te weinig actief C	jaarrond groenbedekking, toepassing van biostimulanten, bekalking, toepassing van plantenkool (biochar), bodem beluchten ...	

GROENBEMESTER-ADVIES









Methoden & opmerkingen

* CEC plantbeschikbaar = som van Ca, Mg, K, Na en H⁺ uit de H3A-extractie (Haney); alleen het direct beschikbare deel van het adsorptiecomplex, daardoor duidelijk lager dan CEC pot (DIN ISO 13536) en CEC act. Potentiële verzuring: afgeleid uit (Ca + Mg) : Al van de H3A-extractie. Nutriëntenbalans: gewogen afwijking van het optimum (pH, CEC-verschil, basenverzadiging, nutriënten-streefwaarden), vóór bemesting. pH-waarden en organische stof uit de Haney-analyse; basenverzadigings-streefwaarde (CEC-pot-afhankelijk) aan alle drie de adsorptiecomplexen.

Nutriëntengehalten · verhoudingen · wisselwerkingen

NUTRIËNTENGEHALTEN – TWEE FRACTIES

per nutriënt: plantbeschikbaar (Haney H3A) en naleverbaar/uitwisselbaar (Mehlich-3), kg/ha


	plantbeschikbaar (H3A)			naleverbaar (Mehlich-3)		
	IS	STREEF		IS	STREEF	
Calcium	547	831		2.774	8.352	
Magnesium	118	88,0		239	596	
Kalium	382	95,4		487	569	
Natrium	55,8	–		55,6	55,9	
Fosfor (PO ₄ / M3)	201	58,2		478	179	
nalev. org. fosfor	65,5	29,1		–		
Zwavel	89,6	88,2		77,8	139	
Borium	0,470	3,63		0,473	4,44	
Koper	0,412	0,300		1,39	18,1	
Mangaan	5,14	14,7		36,1	209	
Ijzer	1.642	88,2		2.388	723	
Zink	15,8	13,3		33,6	27,8	
Molybdeen	0,103	0,500		n. m.	1,61	
Kobalt	0,015	4,00		1,95	8,56	
Seleen	–			1,03	3,61	

‡ Kobalt/seleen uit totaalontsluiting. IS en STREEF in kg/ha; markering = positie IS t.o.v. STREEF (midden = STREEF bereikt).


NUTRIËNTENVERHOUDINGEN

in overmaat in balans in overmaat


Mehlich-3 / CAL (Soil Balancing)



H3A / bodembioïlogie (Haney)



NUTRIËNTEN-WISSELWERKINGEN (MULDER)



Weergegeven worden alleen de in dit monster aanwezige negatieve wisselwerkingen en de synergieën die voor het herstel van het evenwicht kunnen worden benut.

LUFA-STANDAARDANALYSE · GEHALTEKLASSEN

Nederland · gehalteklassen volgens Beiers schema

Fosfor (P ₂ O ₅ , CAL)	39,0 mg/100 g	Kl. E
Kalium (K ₂ O, CAL)	17,1 mg/100 g	Kl. D
Magnesium (CaCl ₂)	8,1 mg/100 g	Kl. C

Bemestingsadvies

Meststof	Hoeveelheid	Dekt	Periode	Toediening / opmerking
Dolomiet 60 % CaCO ₃ · 25 % MgCO ₃	4.000 kg/ha	Calcium + magnesium (opbouw basenverzadiging)	verdeeld over 3–4 jaar	Basisbemesting (Ca + Mg); onderhoudsbekalking na carbonaattest voortzetten. Niet met sporenelementen mengen – in de tijd scheiden.
Natriummolybdaat 39 % Mo	5,5 kg/ha	Molybdeen	verdeeld over 3–4 jaar	Vóór de sulfaatmeststoffen toedienen (Mo-beschikbaarheid daalt bij sulfaat-S). Bladbemesting; mengbaar onder drijfmest.
Calciumsulfaat (gips) 33 % CaO · 46 % SO ₃	550 kg/ha	Sulfaatzwavel + calcium	verdeeld over 3–4 jaar	Leverd Ca en sulfaatzwavel zonder pH-verhoging; in het voorjaar strooien. Niet met wateroplosbare P combineren (vastlegging).
Kieseriet 25 % MgO · 50 % SO ₃	180 kg/ha	Magnesium (+ sulfaatzwavel)	2–3 jaar	Goed wateroplosbaar; in het voorjaar in het groeiende gewas of in de groenbemester strooien, over meerdere giften over de jaren verdelen. Dekt tegelijk het sulfaataandeel van de zwavel.
Patentkali 30 % K ₂ O · 10 % MgO · 44 % SO ₃	330 kg/ha	Kalium + magnesium (+ sulfaat-S)	verdeeld over 3–4 jaar	Dekt K en Mg (chloridearm); in het voorjaar strooien.
Boorzuur 17,4 % B	30 kg/ha	Borium	verdeeld over 3–4 jaar	Niet op voorraad te bemesten; bladbemesting, jaarlijks naar behoefte herhalen.
Kopersulfaat 23 % Cu	29 kg/ha	Koper	verdeeld over 3–4 jaar	Niet samen met kalk/calcium – in de tijd scheiden; met humuszuren werkzamer.
Mangaansulfaat 30 % Mn	50 kg/ha	Mangaan	verdeeld over 3–4 jaar	Bladbemesting, niet met kalk/calcium mengen, met humuszuren werkzamer.
Natriumselenaat 39 % Se	2 kg/ha	Seleen	verdeeld over 3–4 jaar	Voor voeder- en diergezondheid; als bladgift toedienen.

AANWIJZINGEN VOOR DE UITVOERING

Toediening – groenbemester, klaver-/luzernegras of opnamesterke hoofdteelt: De aanbevolen meststofhoeveelheden zijn soms zeer hoog. De toediening veroorzaakt een kortstondige onbalans waarop het bodemleven zich eerst moet instellen. Bij voorkeur in groenbemester- of klaver-/luzernegrasbestanden toedienen – daar worden de nutriënten gedynamiseerd en liggen ze voor het volggewas in de juiste verhouding klaar. Als alternatief kunnen de meststoffen ook direct in hoofdteelten met een goed opnamevermogen voor het betreffende nutriënt worden toegediend – daar tot maximaal het dubbele van de gewasbehoefte per gift. Opnamesterke gewassen:

Sulfaten (S): Koolzaad, kool- en uengewassen, peulvruchten, grasland
Calcium: Koolzaad, aardappelen, koolgewassen, klaver-/luzernegras, grasland
Magnesium: Aardappelen, bieten, maïs, klaver-/luzernegras
Kalium: Bieten, aardappelen, maïs, koolgewassen, klaver-/luzernegras
Natrium: Suiker-/voederbieten (natriuminnend), voederkool
Fosfor: Aardappelen, maïs, klaver-/luzernegras, grasland
Borium: Koolzaad, suiker-/voederbieten, zonnebloemen, koolgewassen, luzerne

Molybdeen: Peulvruchten, klaver-/luzernegras, koolsoorten, koolzaad
Kobalt: Peulvruchten (veldboon, soja, lupine, erwt), klaver-/luzernegras
Koper: Haver, tarwe, gerst, zonnebloemen, grasland
Zink: Maïs, vlas, hop, fruitteelt
Mangaan: Haver, tarwe, suiker-/voederbieten, erwten/veldbonen
Seleen: Grasland (voederkwaliteit)

Organische bemesting: Aan organische meststoffen dienen dragerstoffen (steenmeel / plantenkool) te worden toegevoegd om uitspoeling te voorkomen en het adsorptiecomplex niet met nutriënten te overladen.

Sporenelementen: Zink (evenals koper, mangaan, ijzer, kobalt) niet samen met kalk/calcium toedienen – in de tijd scheiden. Ze kunnen voor de toediening ook gezamenlijk onder drijfmest/compost worden gemengd (in plaats van bladbemesting).

Systemische aanpak: De methode heeft alleen in samenspel met consequente groenbemesterteelt, onderzaai en mengteelt het gewenste resultaat.

De berekende meststofhoeveelheden zijn richtwaarden voor het sluiten van het vastgestelde nutriëntentekort; het naleven van de geldende bemestingsregelgeving (bijv. mestwetgeving, uitrijdverboden, bedrijfsspecifieke plafonds) valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. De weergegeven waarden en adviezen vervangen geen individueel deskundig advies en zijn niet juridisch bindend.

Soil Balancing + bodemvitaliteit volgens Haney · perceelsvergelijking

	Voorbeeldperceel B	Voorbeeldperceel A
Balk tot aan de rode middenlijn = streefwaarde bereikt; korter = tekort, langer = overmaat (schaal tot 2 x streefwaarde)		

BODEM-BASISGEGEVENS — AFWIJKING VAN STREEF

pH (CaCl ₂) · streef 6,0-6,5	Voorbeeldperceel B: -1,5	Voorbeeldperceel A: -1,2
pH (H ₂ O) · streef 6,0-6,5	Voorbeeldperceel B: -0,8	Voorbeeldperceel A: -0,5
C/N · streef ~11	Voorbeeldperceel B: +6,4	Voorbeeldperceel A: +5,8
Ca + Mg : Al · streef ≥ 2 : 1	Voorbeeldperceel B: +0,1	Voorbeeldperceel A: +0,1
Nutriëntenbalans % · streef 100	Voorbeeldperceel B: -84	Voorbeeldperceel A: -85

BASENVERZADIGING (CEC POT) · % — AFW. VAN STREEF

Calcium	Voorbeeldperceel B: -49,2	Voorbeeldperceel A: -49,0
Magnesium	Voorbeeldperceel B: -6,2	Voorbeeldperceel A: -5,8
Kalium	Voorbeeldperceel B: -0,7	Voorbeeldperceel A: -0,8
Natrium	Voorbeeldperceel B: -0,2	Voorbeeldperceel A: +0,2

BODEMBIOLOGIE (HANEY)

Bodemvitaliteit	Voorbeeldperceel B: 22,6	Voorbeeldperceel A: 12,4
SHS (US-berekening)	Voorbeeldperceel B: 10,9	Voorbeeldperceel A: 8,8
microb. ademhaling CO ₂ -C mg/kg	Voorbeeldperceel B: 27	Voorbeeldperceel A: 24
Microbenvoer-C ppm	Voorbeeldperceel B: 199	Voorbeeldperceel A: 166
waterextr. N (WEN) ppm	Voorbeeldperceel B: 75,6	Voorbeeldperceel A: 62,4
microbieel actief C %	Voorbeeldperceel B: 13,6	Voorbeeldperceel A: 14,4
Verzuringindex	Voorbeeldperceel B: 49	Voorbeeldperceel A: 48

OVERIGE KENGETALLEN (ZONDER STREEF)

Humus %	Voorbeeldperceel B: 5,4	Voorbeeldperceel A: 5,8
H ⁺ / rest %	Voorbeeldperceel B: 73,3	Voorbeeldperceel A: 72,6
CEC pot cmol ⁺ /kg	Voorbeeldperceel B: 20,8	Voorbeeldperceel A: 21,0
CEC act cmol ⁺ /kg	Voorbeeldperceel B: 6,8	Voorbeeldperceel A: 7,7
CEC plantbeschikbaar cmol ⁺ /kg	Voorbeeldperceel B: 2,1	Voorbeeldperceel A: 2,1
Bulkdichtheid g/cm ³	Voorbeeldperceel B: 1,39	Voorbeeldperceel A: 1,39
ENR kg N/ha	Voorbeeldperceel B: 67	Voorbeeldperceel A: 74
P ₂ O ₅ (CAL) mg/100 g	Voorbeeldperceel B: 38,7	Voorbeeldperceel A: 39,0
K ₂ O (CAL) mg/100 g	Voorbeeldperceel B: 16,8	Voorbeeldperceel A: 17,1
Mg (CaCl ₂) mg/100 g	Voorbeeldperceel B: 7,4	Voorbeeldperceel A: 8,1

Balklengte relatief t.o.v. de grootste van beide waarden.

NUTRIËTENGEGHALTEN · kg/ha — AFW. VAN STREEF

Zwavel	Voorbeeldperceel B: -63,9	Voorbeeldperceel A: -61,2
Fosfor	Voorbeeldperceel B: +344	Voorbeeldperceel A: +300
Calcium	Voorbeeldperceel B: -5.928	Voorbeeldperceel A: -5.578
Magnesium	Voorbeeldperceel B: -417	Voorbeeldperceel A: -357
Kalium	Voorbeeldperceel B: -128	Voorbeeldperceel A: -83
Natrium	Voorbeeldperceel B: -17,4	Voorbeeldperceel A: -0,3
Borium	Voorbeeldperceel B: -3,5	Voorbeeldperceel A: -4,0
Ijzer	Voorbeeldperceel B: +1.626	Voorbeeldperceel A: +1.665
Mangaan	Voorbeeldperceel B: -175,1	Voorbeeldperceel A: -172,4
Koper	Voorbeeldperceel B: -16,7	Voorbeeldperceel A: -16,7
Zink	Voorbeeldperceel B: +2,5	Voorbeeldperceel A: +5,8
Molybdeen	Voorbeeldperceel B: -1,5	Voorbeeldperceel A: -1,5
Kobalt	Voorbeeldperceel B: -6,4	Voorbeeldperceel A: -6,6
Seleen	Voorbeeldperceel B: -2,8	Voorbeeldperceel A: -2,6

BEMESTINGSADVIES · kg/ha

Dolomiet	Voorbeeldperceel B: 4.000	Voorbeeldperceel A: 4.000
Natriummolybdaat	Voorbeeldperceel B: 6	Voorbeeldperceel A: 6
Calciumsulfaat (gips)	Voorbeeldperceel B: 550	Voorbeeldperceel A: 550
Kieseriet	Voorbeeldperceel B: 300	Voorbeeldperceel A: 180
Magnesia-Kainiet	Voorbeeldperceel B: 80	Voorbeeldperceel A: 0
Kaliumsulfaat	Voorbeeldperceel B: 180	Voorbeeldperceel A: 0
Boorzuur	Voorbeeldperceel B: 30	Voorbeeldperceel A: 30
Kopersulfaat	Voorbeeldperceel B: 29	Voorbeeldperceel A: 29
Mangaansulfaat	Voorbeeldperceel B: 50	Voorbeeldperceel A: 50
Natriumselenaat	Voorbeeldperceel B: 2	Voorbeeldperceel A: 2
Patentkali	Voorbeeldperceel B: 0	Voorbeeldperceel A: 330

Balklengte relatief t.o.v. de grootste van beide hoeveelheden (geen streef-relatie).